

ユルトミリス®点滴静注300 mg、ユルトミリス®HI点滴静注300mg/3mL及び1100mg/11mL 発作性夜間ヘモグロビン尿症に関する特定使用成績調査
重篤副作用ラインリスト

このWebサイト上の情報は、対象医薬品の使用に伴って観察された副作用の可能性がある事象ですが、これらは必ずしも対象医薬品の使用と因果関係を有するものではありません。

これらの情報は、対象医薬品またはその活性物質がここに掲げる事象をもたらすものであること、またはそれらが安全に使用することのできないものであることを意味するものではありません。対象医薬品のベネフィット及びリスクは、全ての利用可能なデータを詳細に検討し科学的に評価することによってのみ結論づけられるものです。

また、こうした情報の提供は、規制当局や製薬企業が医薬品及びその活性物質の安全性を検討するために使用する情報を、医療関係者に広く公開し、安全性の検討についての透明性を確保することを目的としています。

なお、これらの情報は、今後の調査により予告なしに変更される可能性があります。

連番	性別	投与開始時年齢	合併症	重篤な副作用			
				PT 日本語	投与開始から 発現までの日数	転帰	因果関係
1	男性	50歳代	喘息、慢性副鼻腔炎	上気道の炎症	1	回復	あり
2	男性	70歳代	骨髄異形成症候群、塞栓症	急性骨髄性白血病	129	不明	あり
3	男性	50歳代	本態性血小板血症、胃潰瘍、高血圧、高尿酸血症	貧血	50	未回復	あり
4	男性	80歳代	腹部膨満、良性前立腺肥大症、骨髄異形成症候群、末梢性ニューロパチー、血管拡張、軟便	直腸出血	5	回復	あり
				気管支炎	19	回復	あり
				肺炎	209	回復	あり
				腸球菌性敗血症	217	回復	あり
				感染性関節炎	366	回復	あり
5	女性	60歳代	再生不良性貧血	アシネトバクター性肺炎	480	死亡	あり
				シユードモナス性肺炎	128	死亡	あり
				シユードモナス性敗血症	128	死亡	あり
6	女性	40歳代	再生不良性貧血	再発乳癌	596	未回復	あり
7	男性	70歳代	再生不良性貧血、背部痛、骨髄異形成症候群、鉄過剰	咽頭炎	78	回復	あり
8	男性	40歳代	再生不良性貧血、パセドウ病、続発性甲状腺機能低下症	貧血	295	未回復	あり
9	男性	80歳代	再生不良性貧血	肺炎	86	軽快	あり
10	女性	60歳代	再生不良性貧血	高ビリルビン血症	330	回復	あり
				好中球減少症	533	未回復	あり
11	女性	50歳代	胆石症	カンピロバクター胃腸炎	92	回復	あり
12	女性	40歳代	子宮平滑筋腫	上気道の炎症	9	回復	あり
13	男性	70歳代	再生不良性貧血、心房細動、良性前立腺肥大症、糖尿病、丹毒、高血圧、甲状腺機能低下症、心嚢液貯留	貧血	288	軽快	あり
				甲状腺機能低下症	505	軽快	あり
14	男性	40歳代	虫垂炎、糖尿病、高尿酸血症、腸重積症、統合失調症、睡眠時無呼吸症候群、脂質異常症、塞栓症	上咽頭炎	33	軽快	あり
				低カリウム血症	302	回復	あり
				発熱	302	回復	あり
				発熱	302	回復	あり
15	男性	60歳代	高血圧、骨髄増殖性新生物	脾静脈血栓症	343	回復	あり
				脾静脈血栓症	448	回復	あり
16	男性	20歳代	なし	リンパ筋炎	129	回復	あり
17	女性	80歳代	頭痛	狭心症	517	軽快	あり
18	女性	60歳代	再生不良性貧血、骨髄異形成症候群	発熱	83	回復	あり
19	男性	70歳代	再生不良性貧血	肺炎	7	回復	あり
20	男性	70歳代	狭心症、再生不良性貧血、脳梗塞、便秘、高血圧、脂質異常症、腎性貧血、塞栓症、慢性腎臓病	带状疱疹	534	軽快	あり
21	女性	70歳代	胃潰瘍	細菌性肺炎	351	回復	あり
22	女性	20歳代	再生不良性貧血	溶血	71	回復	あり
23	男性	70歳代	再生不良性貧血、糖尿病、高血圧、高尿酸血症、中毒性腎症、鉄過剰	細菌性肺炎	76	死亡	あり
				肺炎	127	死亡	あり
				胃腸出血	184	死亡	あり
24	男性	70歳代	再生不良性貧血、糖尿病、高血圧、高尿酸血症、腎性貧血、慢性腎臓病、鉄過剰	腎機能障害	21	未回復	あり
				腎機能障害	71	未回復	あり
				フィブリンDダイマー増加	119	未回復	あり
				フィブリン分解産物増加	119	未回復	あり
				肺炎	120	軽快	あり
				再生不良性貧血	128	未回復	あり
				状態悪化	128	未回復	あり
				浮動性めまい	130	未回復	あり
				発作性夜間血色素尿症	130	死亡	あり
				状態悪化	130	死亡	あり
				転倒	130	未回復	あり
				大腿骨骨折	130	未回復	あり

ユルトミリス@点滴静注300mg、ユルトミリス@HI点滴静注300mg/3mL及び1100mg/11mL 発作性夜間ヘモグロビン尿症に関する特定使用成績調査
重篤副作用ラインリスト

このWebサイト上の情報は、対象医薬品の使用に伴って観察された副作用の可能性がある事象ですが、これらは必ずしも対象医薬品の使用と因果関係を有するものではありません。

これらの情報は、対象医薬品またはその活性物質がここに掲げる事象をもたらすものであること、またはそれが安全に使用することのできないものであることを意味するものではありません。対象医薬品のベネフィット及びリスクは、全ての利用可能なデータを詳細に検討し科学的に評価することによってのみ結論づけられるものです。

また、こうした情報の提供は、規制当局や製薬企業が医薬品及びその活性物質の安全性を検討するために使用する情報を、医療関係者に広く公開し、安全性の検討についての透明性を確保することを目的としています。

なお、これらの情報は、今後の調査により予告なしに変更される可能性があります。

連番	性別	投与開始時年齢	合併症	重篤な副作用			
				PT 日本語	投与開始から 発現までの日数	転帰	因果関係
25	男性	70歳代	不安定狭心症	胆嚢炎	365	回復	あり
				抱合ビリルビン増加	365	軽快	あり
				肝機能検査値上昇	365	軽快	あり
26	女性	80歳代	なし	発熱	19	回復	あり
				27	男性	90歳代	なし
間質性肺炎患	424	未回復	あり				
28	女性	30歳代	なし	心不全	426	不明	あり
				冠動脈狭窄	426	不明	あり
				バルボウイルスB19感染	8	回復	あり
29	男性	70歳代	塞栓症	貧血	9	回復	あり
30	男性	50歳代	良性前立腺肥大症	感染	9	回復	あり
31	女性	60歳代	再生不良性貧血、腎機能障害	胆嚢腫大	295	回復	あり
32	男性	70歳代	なし	伝音難聴	不明	不明	あり
33	女性	80歳代	狭心症、再生不良性貧血、背部痛、慢性胃炎、便秘、大腿骨頸部骨折、裂孔ヘルニア、高血圧、緊張性膀胱、不眠症、頭蓋内動脈瘤、骨髄異形成症候群、頸部痛、末梢性ニューロパチー、末梢性浮腫、変形性関節症、骨粗鬆症、皮膚肥厚、上室性頻脈、左室肥大、食道静脈瘤、慢性腎臓病、2型糖尿病、老人性乾皮症	結腸癌	17	未回復	あり
				クレブシエラ性敗血症	315	回復	あり
34	女性	80歳代	再生不良性貧血	貧血	15	未回復	あり
35	女性	20歳代	再生不良性貧血	注入に伴う反応	21	回復	あり
36	男性	80歳代	なし	骨髄異形成症候群	15	未回復	あり
37	男性	40歳代	良性前立腺肥大症、肝機能異常、高尿酸血症、尿管結石症	細菌性敗血症	90	軽快	あり
				淋菌感染	90	軽快	あり
				発作性夜間血色素尿症	92	軽快	あり
				状態悪化	92	軽快	あり
38	男性	40歳代	高尿酸血症、急性膵炎	発熱	60	回復	あり
39	女性	80歳代	再生不良性貧血、糖尿病、胃食道逆流性疾患、高血圧	深部静脈血栓症	413	回復	あり
40	女性	40歳代	喘息	胆管結石	418	軽快	あり
41	男性	70歳代	糖尿病	肺炎	375	死亡	あり
42	女性	40歳代	なし	溶血	193	回復	あり
43	男性	70歳代	良性前立腺肥大症、便秘、肝性脳症	肝細胞癌	263	軽快	あり
44	男性	30歳代	潰瘍性大腸炎	脛骨骨折	126	軽快	あり
				潰瘍性大腸炎	245	回復	あり
45	男性	70歳代	再生不良性貧血、良性前立腺肥大症、皮膚筋炎、高尿酸血症、低カルシウム血症、感染、骨壊死、血栓症、塞栓症、臍新生物	発熱	102	回復	あり
				末梢腫脹	102	回復	あり
				炎症	102	回復	あり
				血中乳酸脱水素酵素増加	102	回復	あり
				ヘモグロビン減少	102	軽快	あり
46	男性	60歳代	胆石症、糖尿病、高血圧	細菌性腸炎	477	回復	あり
47	男性	60歳代	再生不良性貧血	COVID-19	568	死亡	あり
				COVID-19肺炎	568	死亡	あり
				SARS-CoV-2検査陽性	568	死亡	あり

※ 今後の調査により内容が変更となる場合があります。