

このWebサイト上の情報は、対象医薬品の使用に伴って観察された副作用の可能性のある事象ですが、これらは必ずしも対象医薬品の使用と因果関係を有するものではありません。

これらの情報は、対象医薬品またはその活性物質がここに掲げる事象をもたらすものであること、またはそれらが安全に使用することのできないものであることを意味するものではありません。対象医薬品のベネフィット及びリスクは、全ての利用可能なデータを詳細に検討し科学的に評価することによってのみ結論づけられるものです。

また、こうした情報の提供は、規制当局や製薬企業が医薬品及びその活性物質の安全性を検討するために使用する情報を、医療関係者に広く公開し、安全性の検討についての透明性を確保することを目的としています。

なお、これらの情報は、今後の調査により予告なしに変更される可能性があります。

連番	性別	年代	合併症	副作用	投与開始から発現までの日数	転帰	因果関係	
1	男性	50代	喘息	上気道の炎症	1	回復	あり	
			慢性副鼻腔炎					
2	男性	50代	本態性血小板血症	貧血	50	未回復	あり	
			胃潰瘍					
			高血圧					
			高尿酸血症					
3	男性	80代	腹部膨満	直腸出血	5	回復	あり	
			良性前立腺肥大症	気管支炎	19	回復	あり	
			骨髄異形成症候群	肺炎	209	回復	あり	
			末梢性ニューロパチー	腸球菌性敗血症	217	回復	あり	
			血管拡張	感染性関節炎	366	回復	あり	
			軟便	アシネトバクター性肺炎	480	死亡	あり	
4	女性	60代	再生不良性貧血	シュードモナス性肺炎	128	死亡	あり	
				シュードモナス性敗血症	128	死亡	あり	
5	女性	40代	再生不良性貧血	再発乳癌	596	不明	あり	
6	男性	70代	再生不良性貧血	咽頭炎	78	回復	あり	
			背部痛					
			骨髄異形成症候群					
			鉄過剰					
7	男性	40代	再生不良性貧血	貧血	295	未回復	あり	
			バセドウ病					
			続発性甲状腺機能低下症					
8	男性	80代	再生不良性貧血	肺炎	86	軽快	あり	
9	女性	60代	再生不良性貧血	高ビリルビン血症	330	回復	あり	
				好中球減少症	533	未回復	あり	
10	女性	50代	胆石症	カンピロバクター胃腸炎	92	回復	あり	
11	女性	40代	子宮平滑筋腫	上気道の炎症	9	回復	あり	
12	男性	70代	再生不良性貧血	貧血	288	軽快	あり	
			心房細動	甲状腺機能低下症	505	軽快	あり	
			良性前立腺肥大症	心膜炎	725	回復	あり	
			糖尿病					
			丹毒					
			高血圧					
			甲状腺機能低下症					
			心嚢液貯留					
13	男性	40代	虫垂炎	上咽頭炎	33	軽快	あり	
			糖尿病	低カリウム血症	302	回復	あり	
			高尿酸血症	発熱	302	回復	あり	
			腸重積症					
			統合失調症					
			睡眠時無呼吸症候群					
			脂質異常症					
			塞栓症					
14	男性	60代	高血圧	脾静脈血栓症	343	回復	あり	
			骨髄増殖性新生物					
15	男性	20代	無	リンパ節炎	129	回復	あり	
16	女性	80代	頭痛	狭心症	517	軽快	あり	
17	女性	60代	再生不良性貧血	発熱	83	回復	あり	
			骨髄異形成症候群					
18	女性	70代	胃潰瘍	細菌性肺炎	351	回復	あり	

このWebサイト上の情報は、対象医薬品の使用に伴って観察された副作用の可能性のある事象ですが、これらは必ずしも対象医薬品の使用と因果関係を有するものではありません。

これらの情報は、対象医薬品またはその活性物質がここに掲げる事象をもたらすものであること、またはそれらが安全に使用することのできないものであることを意味するものではありません。対象医薬品のベネフィット及びリスクは、全ての利用可能なデータを詳細に検討し科学的に評価することによってのみ結論づけられるものです。

また、こうした情報の提供は、規制当局や製薬企業が医薬品及びその活性物質の安全性を検討するために使用する情報を、医療関係者に広く公開し、安全性の検討についての透明性を確保することを目的としています。

なお、これらの情報は、今後の調査により予告なしに変更される可能性があります。

連番	性別	年代	合併症	副作用	投与開始から発現までの日数	転帰	因果関係
19	男性	70代	再生不良性貧血	細菌性肺炎	76	死亡	あり
			糖尿病	胃腸出血	184	死亡	あり
			高血圧				
			高尿酸血症				
			中毒性腎症				
			鉄過剰				
20	男性	70代	再生不良性貧血	腎機能障害	21	未回復	あり
			糖尿病	フィブリンDダイマー増加	119	未回復	あり
			高血圧	フィブリン分解産物増加	119	未回復	あり
			高尿酸血症	肺炎	120	軽快	あり
			腎性貧血	再生不良性貧血	128	未回復	あり
			慢性腎臓病	状態悪化	128	未回復	あり
			鉄過剰	浮動性めまい	130	未回復	あり
				発作性夜間血色素尿症	130	死亡	あり
				状態悪化	130	死亡	あり
				転倒	130	未回復	あり
				大腿骨骨折	130	未回復	あり
21	女性	80代	無	発熱	19	回復	あり
22	女性	30代	無	パルボウイルス B 1 9 感染	8	回復	あり
				貧血	9	回復	あり
23	男性	70代	塞栓症	感染	9	回復	あり
24	男性	50代	良性前立腺肥大症	胆嚢腫大	295	回復	あり
25	女性	60代	再生不良性貧血	伝音難聴	不明	不明	あり
			腎機能障害				
26	男性	70代	無	結腸癌	17	未回復	あり
27	女性	80代	狭心症	クレブシエラ性敗血症	315	回復	あり
			再生不良性貧血				
			背部痛				
			慢性胃炎				
			便秘				
			大腿骨頸部骨折				
			裂孔ヘルニア				
			高血圧				
			緊張性膀胱				
			不眠症				
			頭蓋内動脈瘤				
			骨髄異形成症候群				
			頸部痛				
			末梢性ニューロパチー				
			末梢性浮腫				
			変形性関節症				
			骨粗鬆症				
			皮膚肥厚				
			上室性頻脈				
			左室肥大				
			食道静脈瘤				
			慢性腎臓病				
			2型糖尿病				
老人性乾皮症							
28	女性	80代	再生不良性貧血	貧血	15	未回復	あり
29	女性	20代	再生不良性貧血	注入に伴う反応	21	回復	あり
30	男性	80代	無	骨髄異形成症候群	15	未回復	あり

このWebサイト上の情報は、対象医薬品の使用に伴って観察された副作用の可能性のある事象ですが、これらは必ずしも対象医薬品の使用と因果関係を有するものではありません。

これらの情報は、対象医薬品またはその活性物質がここに掲げる事象をもたらすものであること、またはそれらが安全に使用することのできないものであることを意味するものではありません。対象医薬品のベネフィット及びリスクは、全ての利用可能なデータを詳細に検討し科学的に評価することによってのみ結論づけられるものです。

また、こうした情報の提供は、規制当局や製薬企業が医薬品及びその活性物質の安全性を検討するために使用する情報を、医療関係者に広く公開し、安全性の検討についての透明性を確保することを目的としています。

なお、これらの情報は、今後の調査により予告なしに変更される可能性があります。

連番	性別	年代	合併症	副作用	投与開始から発現までの日数	転帰	因果関係
31	男性	40代	良性前立腺肥大症	細菌性敗血症	90	軽快	あり
			肝機能異常	淋菌感染	90	軽快	あり
			高尿酸血症	発作性夜間血色素尿症	92	軽快	あり
			尿管結石症	状態悪化	92	軽快	あり
32	男性	40代	急性膵炎	発熱	60	回復	あり
33	女性	80代	再生不良性貧血	深部静脈血栓症	413	回復	あり
			糖尿病				
			胃食道逆流性疾患				
			高血圧				
34	男性	70代	良性前立腺肥大症	肝細胞癌	263	未回復	あり
			便秘				
			肝性脳症				
35	男性	30代	潰瘍性大腸炎	脛骨骨折	126	軽快	あり
36	男性	70代	再生不良性貧血	発熱	102	回復	あり
			良性前立腺肥大症	末梢腫脹	102	回復	あり
			皮膚筋炎	炎症	102	回復	あり
			高尿酸血症	血中乳酸脱水素酵素増加	102	軽快	あり
			低カルシウム血症	ヘモグロビン減少	102	軽快	あり
			感染				
			骨壊死				
			血栓症				
			塞栓症				
			膵新生物				

※ 今後の調査により内容が変更となる場合があります。