

このような症状に心当たりはありませんか？

前回の来院から今日までに、当てはまる症状があれば教えてください

● 主に（溶血性）貧血による一般的な症状



息切れ



疲れ



めまい



階段の上り下りで息切れする



皮膚や目の色が黄色い

● PNHに特徴的な症状



お腹の痛み



食べ物が飲み込みにくい



胸の痛み



背中や腰の痛み



男性機能不全

最も近い色はどれですか？

①いつも

②体調をくずしたとき

(例：風邪をひいたとき等)



1



2



3



4



5



6



7



8



9




10

今ある症状とPNHの重症度を見てみましょう

PNHの重症度は溶血の程度(LDH値、溶血発作の頻度)、溶血に伴う臓器の障害や症状などによって「軽症」「中等症」「重症」の3つに分類されます¹⁾。

溶血の程度に関わらず、臓器の障害や症状によっては、重症度が変わる可能性があります。

発作性夜間ヘモグロビン尿症診療の参照ガイド 令和1年改訂版に基づき作成



※中等症以上は指定難病の認定基準を満たすため、特定医療費支給認定(医療費助成)の申請が可能です³⁾。医療費の支給や制度の最新情報については、保健所などに確認や問い合わせをしてください。

[†] 溶血発作とは、肉眼的ヘモグロビン尿を認める状態を指します。

LDH値の正常範囲：124～222 U/L²⁾ (医療機関によって数値が異なります)

【文献請求先及び問い合わせ先】

アレクシオンファーマ合同会社 メディカル インフォメーション センター
〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目1番1号 田町ステーションタワーN
フリーダイヤル：0120-577-657
受付時間：9：00～18：00 (土、日、祝日及び当社休業日を除く)

- 1) 発作性夜間ヘモグロビン尿症診療の参照ガイド 令和1年改訂版, p4
- 2) 櫻林郁之介 監, 「今日の臨床検査2019-2020」, 東京：南江堂, 2019, p217
- 3) 難病情報センター (<https://www.nanbyou.or.jp/>) (2021年4月6日アクセス)

